

## Betegájékoztató: Információk a felhasználó számára

### **Bolus laxans tabletta**

extractum rhei siccum (száraz rebarbara kivonat)  
sulfur praecipitatum (lecsapott kén)  
sennae folii pulvis (szennalevél por)  
kaolinum ponderosum (nehéz kaolin)

**Mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegájékoztatót, mert az Ön számára fontos információkat tartalmaz.**

Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően szedje.

- Tartsa meg a betegájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. Ez a betegájékoztatóban fel nem sorolt bármely lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. Lásd 4. pont.
- Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, ha tünetei 3 napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

### **A betegájékoztató tartalma:**

1. Milyen típusú gyógyszer a Bolus laxans tabletta és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Bolus laxans tabletta szedése előtt
3. Hogyan kell alkalmazni a Bolus laxans tablettát?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell a Bolus laxans tablettát tárolni?
6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

### **1. Milyen típusú gyógyszer a Bolus laxans tabletta és milyen betegségek esetén alkalmazható?**

A Bolus laxans tabletta több összetevőből álló székletlazító készítmény. A hatás kialakulásához legalább 6 óra szükséges, mivel a vegyületnek el kell jutnia a vastagbélbe.

### **2. Tudnivalók a Bolus laxans tabletta szedése előtt**

#### **Ne szedje a Bolus laxans tablettát**

- Ha allergiás a hatóanyagokra vagy a gyógyszer (6. pontban felsorolt) egyéb összetevőjére.
- Bélelzáródás esetén.
- A belek gyulladással megbetegedései (pl. Chron betegség, fekélyes vastagbélgyulladás [kolitisz ulceróza], féregnyúlvány-gyulladás) esetén.
- Súlyos kiszáradás esetén.
- Káliumhiány esetén.
- Tisztázatlan eredetű hasi panaszok, illetve tünetek esetén.

#### **Figyelmeztetések és óvintézkedések**

Hosszan tartó (több mint 1-2 hét) alkalmazása kerülendő.

Kaolin tartalma miatt több gyógyszerrel oldhatatlan komplexet képezhet és csökkenti felszívódásukat.

#### **Egyéb gyógyszerek és a Bolus laxans tabletta**

Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett, valamint szedni tervezett egyéb gyógyszereiről.

Bizonyos gyógyszerekkel (pl. digoxin, más szívritmuszavarra szedett gyógyszerek, egyes vízajtók, mellékvesekéreg hormonok) egyidejűleg szedve fokozott óvatosság szükséges, mert azok hatása módosulhat.

#### **A Bolus laxans egyidejű bevétele étellel és itallal**

Nincs adat arra vonatkozóan, hogy az étkezés minősége, ill. mennyisége befolyást gyakorolna a gyógyszer által kifejtett hatásra. A készítményhez fontos a bő (1-2 liter) folyadékbevitel.

#### **Terhesség és szoptatás**

Ha Ön terhes vagy szoptat, illetve ha fennáll Önnél a terhesség lehetősége vagy gyermeket szeretne, a gyógyszer alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

A Bolus laxans terhességben és szoptatás ideje alatt való alkalmazásáról nincs megfelelő tapasztalat, ezért fenti állapotokban feltétlenül kérjen tanácsot orvosától, mielőtt elkezdené szedni a készítményt.

#### **A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre**

A készítménynek a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességeket befolyásoló hatását nem vizsgálták.

#### **A Bolus laxans tablettá répacukrot (szacharózt) tartalmaz**

A készítmény tablettánként 37 mg répacukrot (szacharózt) tartalmaz. Rendeltetésszerű használat esetén egy adag 18,5-148 mg répacukrot tartalmaz.

Amennyiben kezelőorvosa korábban már figyelmeztette Önt, hogy bizonyos cukrokra érzékeny, keresse fel orvosát, mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert.

### **3. Hogyan kell alkalmazni a Bolus laxans tablettát?**

Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa által elmondottaknak megfelelően alkalmazza. Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

#### A készítmény ajánlott adagja:

Felnőttek:

Naponta 3-szor 1-3 db tablettá étkezés után, vagy esténként 1-4 db tablettá.

Gyermekek és serdülők:

6 év felett napi ½-2 db tablettá.

#### Az alkalmazás módja:

Szájon át történő alkalmazásra.

Ha a Bolus laxans tablettá hatását túl erősnek vagy túl gyengének érzi, forduljon kezelőorvosához.

#### **Ha az előírtnál több Bolus laxans tablettát vett be**

A túladagolás lehetséges tünetei: erős hasmenés, só- és vízvesztés, ájulás.

Szándékos vagy véletlen túladagolás esetén értesítse kezelőorvosát, vagy keresse fel a legközelebbi kórház sürgősségi osztályát, mivel orvosi segítségre lehet szüksége.

#### **Ha elfelejtette bevenni a Bolus laxans tablettát**

Ha gyógyszerét elfelejtette bevenni, mielőbb pótolja a kimaradt adagot. Ha már a következő adag bevétele esedékes, ne vegyen be kétszeres adagot a kihagyott adag pótlására, mert ezzel már nem pótolja a kiesett mennyiséget, viszont a túladagolás veszélyének tenné ki magát.

#### **Ha idő előtt abbahagyja a Bolus laxans alkalmazását**

Amennyiben a tervezettnél hamarabb abbahagyja a Bolus laxans tablettá szedését, ennek nem lesz káros következménye, csak a betegség tünetei térnek vissza, gyomor- és bélpanaszai fokozódhatnak.

Ha bármilyen további kérdése van a gyógyszer alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

#### 4. Lehetséges mellékhatások

Mint minden gyógyszer, így ez a gyógyszer is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

*Nem ismert gyakoriságú mellékhatások (a gyakoriság a rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg):*

- hasi fájdalom
- görcsös gyomor-bélpanaszok.
- krónikus alkalmazás esetén előfordulhat a vastagbél barnás elszíneződése, renyhe bélműködés, béltágulat
- májkárosodás igen ritkán előfordulhat
- krónikus alkalmazás esetén előfordulhat fehérjevizelés, vizelet
- a készítmény a vizelet színét megváltoztatja
- bizonyos laboratóriumi vizsgálatok eredményét befolyásolhatja
- krónikus alkalmazás esetén előfordulhat sóvesztés (különösen káliumvesztés, amely a szív működés zavarához és izomgyengeséghez vezethet).

#### Mellékhatások bejelentése

Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. Ez a beteg tájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. A mellékhatásokat közvetlenül a hatóság részére is bejelentheti az [V. függelékben](#) található elérhetőségeken keresztül.

A mellékhatások bejelentésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több információ álljon rendelkezésre a gyógyszer biztonságos alkalmazásával kapcsolatban.

#### 5. Hogyan kell a Bolus laxans tablettát tárolni?

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó.

Legfeljebb 25°C-on tárolandó.

A dobozon és az üvegen feltüntetett lejárati idő (Felhasználható/Felh.:) után ne szedje ezt a gyógyszert. A lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik.

Ne szedje a Bonus laxans tablettát, ha a bomlás látható jeleit (pl. elszíneződés) észleli.

Semmilyen gyógyszert ne dobjon a szennyvízbe vagy a háztartási hulladékba. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy mit tegyen a már nem használt gyógyszereivel. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

#### 6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

##### Mit tartalmaz a Bolus laxans tablettá?

- A készítmény hatóanyaga: 20 mg száraz rebarbara kivonat (extractum rhei siccum), 50 mg lecsapott kén (sulfur praecipitatum), 100 mg szennalevél por (sennae folii pulvis), 400 mg nehéz kaolin (kaolinum ponderosum) tablettánként
- Egyéb összetevők: talkum, szacharóz, burgonyakeményítő, magnézium-sztearát.

##### Milyen a Bolus laxans tablettá külleme és mit tartalmaz a csomagolás?

Zöldesszürke, kerek, lapos, metszett élű, enyhén pettyezett, egyik oldalán „B.LAXANS” körfelirattal ellátott, mechanikai szennyeződésektől mentes, jellegzetes szagú tablettá. A tabletták felületén kismérvű egyenetlenség megengedhető.

40 db tableta LDPE, garanciazáras, rápattanó kupakkal lezárt, mozgáscsillapító betéttel ellátott, barna üvegben és dobozban.

**A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártó**

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Egis Gyógyszergyár Zrt.  
H-1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.  
Magyarország

Gyártó:

Egis Gyógyszergyár Zrt.  
H-9900 Körmen, Mátyás király u. 65.  
Magyarország

OGYI-T-3353/01 (40 db)

**A betegtájékoztató legutóbbi felülvizsgálatának dátuma: 2016. április**