

## **Bolus laxans tabletta Betegtájékoztató**

Mielőtt elkezdné gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.

- Ez a gyógyszer orvosi vény/rendelvény nélkül kapható. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő és szakszerű alkalmazása.
- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További kérdéseivel forduljon gyógyszerészéhez.
- Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei 3 napon belül nem enyhülnek vagy éppen súlyosbodnak.

### **Milyen hatóanyagot és segédanyagokat tartalmaz a készítmény?**

*Hatóanyag:*

20 mg száraz rebarbara kivonat

50 mg lecsapott kén

100 mg szennalevél por

400 mg nehéz kaolin tablettánként.

Segédanyagok: talkum, szacharóz, burgonyakeményítő, magnézium-sztearát.

*Külsőalak:* zöldesszürke, kerek tabletta, egyik oldalán "B. LAXANS" jelzés található.

Kiszerezés: Barna üvegben 40 tabletta.

Gyártó és a forgalomba hozatali engedély jogosultja:

EGIS Gyógyszergyár NyRt.

Budapest, Magyarország

### **1. Milyen betegségek esetén alkalmazható a készítmény?**

Javallatok: A Bolus laxans tabletta több összetevőből álló székletlazító készítmény. A hatás kialakulásához legalább 6 óra szükséges, mivel a vegyületnek el kell jutnia a vastagbélbe.

### **2. Tudnivalók a gyógyszer szedése előtt**

Mikor nem szabad Bolus laxans tablettát szednie?

Ha a készítmény bármely összetevőjével szemben túlérzékenységet (allergiát) tapasztalt.

Bélelzáródás esetén.

Terhesség, szoptatás. A belek gyulladással megbetegedései esetén.

Súlyos kiszáradás, káliumhiány esetén.  
Tisztázatlan eredetű hasi panaszok esetén.

### **Mire figyeljen fokozottan a kezelés során?**

Hosszan tartó (több mint 1-2 hét) alkalmazása kerülendő.

Tartós alkalmazás esetén előfordulhat a vastagbél barnás elszíneződése, béltónus hiány, béltágulat, ionvesztés (különösen káliumvesztés, ami a szív működés zavarához és izomgyengeséghez vezethet), fehérjevizelés, vérvizelés.

A vizelet színét megváltoztatja, bizonyos laboratóriumi vizsgálatok eredményét befolyásolhatja.

#### *Kölcsönhatás más gyógyszerekkel*

Bizonyos gyógyszerekkel (pl. digoxin, más szívritmuszavarra szedett gyógyszerek, egyes vízajtók, mellékvesekéreg hormonok) egyidejűleg szedve fokozott óvatosság szükséges, mert azok hatása módosulhat. Tájékoztassa orvosát, ha Ön más gyógyszereket egyidejűleg szed.

#### *Terhesség és szoptatás*

A Bolus laxans terhességben és szoptatás ideje alatt való alkalmazásáról nincs megfelelő tapasztalat ezért fenti állapotokban feltétlenül kérjen tanácsot orvosától, mielőtt elkezdené szedni a készítményt.

#### *A készítmény hatása a gépjárművezetésre és a baleseti veszéllyel járó munkavégzésre*

Nem várható, hogy a fenti képességeket befolyásolja.

#### *Fontos információk a Bolus laxans tableta egyes összetevőiről*

A készítmény 37 milligramm répacukrot (szaharózt) tartalmaz.

Rendeltetésszerű használat esetén egy adag 18,5-148 milligramm répacukrot tartalmaz, ezért ellenjavallt örökletes gyümölcscukor (fruktóz)-intoleranciában, szőlőcukor/galaktóz felszívódási zavar esetén vagy répacukor-bontó enzim hiánya esetén.

### **3. A gyógyszer szedésével/alkalmazásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók**

Gyógyszerét kizárólag a betegtájékoztatóban előírt adagban és ideig alkalmazza.

Amennyiben kezelőorvosa másképp nem rendeli, szokásos adagja:

#### *Felnőttek:*

Naponta 3-szor 1-3 tableta étkezés után vagy esténként 1-4 tableta.

#### *Gyermekek:*

6 év felett napi 1-2 tableta.

Ha a Bolus laxans tableta hatását túl erősnek vagy túl gyengének érzi, forduljon orvosához.

#### **4. Lehetséges mellékhatások**

A Bolus laxans tableta általában jól tolerálható, ám mint minden gyógyszernek, így a Bolus laxansnak is lehet mellékhatása. Az esetlegesen előforduló mellékhatások (hasi fájdalom, hasi görcsök, igen ritkán májkárosodás) általában enyhék és átmenetiek.

*Mi a teendő túladagolás esetén?*

Tünetek: erős hasmenés, elektrolit- és vízvesztés, ájulás.

Szándékos vagy véletlen túladagolás esetén értesítse kezelőorvosát vagy keresse fel a legközelebbi kórház sürgősségi osztályát, mivel orvosi segítségre lehet szüksége.

#### **5. Hogyan kell tárolni a készítményt?**

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó.  
Legfeljebb 25 °C-on tárolandó.

A gyógyszert csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

OGYI-T-3353/01

Betegtájékoztató OGYI-eng. száma: 14 480/55/03